



## NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

# FR2600975 - Cavités à chauves-souris en Bourgogne

<a href="#">1. IDENTIFICATION DU SITE</a> .....	<a href="#">1</a>
<a href="#">2. LOCALISATION DU SITE</a> .....	<a href="#">2</a>
<a href="#">3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES</a> .....	<a href="#">5</a>
<a href="#">4. DESCRIPTION DU SITE</a> .....	<a href="#">9</a>
<a href="#">5. STATUT DE PROTECTION DU SITE</a> .....	<a href="#">11</a>
<a href="#">6. GESTION DU SITE</a> .....	<a href="#">12</a>

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

### 1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

### 1.2 Code du site

FR2600975

### 1.3 Appellation du site

Cavités à chauves-souris en Bourgogne

### 1.4 Date de compilation

31/05/1995

### 1.5 Date d'actualisation

17/02/2014

### 1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Bourgogne	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
<a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">www.developpement-durable.gouv.fr</a>	<a href="http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr">www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr</a>	<a href="http://www.mnhn.fr">www.mnhn.fr</a> <a href="http://www.spn.mnhn.fr">www.spn.mnhn.fr</a>
<a href="mailto:en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr">en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr</a>		<a href="mailto:natura2000@mnhn.fr">natura2000@mnhn.fr</a>

### 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002



(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/11/2013

(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/06/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030852157>

## 2. LOCALISATION DU SITE

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude** : 4,79111°

**Latitude** : 47,34472°

### 2.2 Superficie totale

3533 ha

### 2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

### 2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
26	Bourgogne

### 2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
21	Côte-d'Or	49 %
58	Nièvre	1 %
71	Saône-et-Loire	46 %
89	Yonne	4 %

### 2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
71005	ALUZE
21013	ANCEY
21014	ANTHEUIL
21051	BAULME-LA-ROCHE
71032	BERZE-LA-VILLE
71031	BERZE-LE-CHATEL
21081	BLAISY-HAUT
71039	BLANOT
71078	CHAMILLY
58055	CHAMPVERT
71107	CHARRECEY



71109	CHASSEY-LE-CAMP
71122	CHEILLY-LES-MARANGES
71137	CLUNY
71149	COUCHES
89125	COURSON-LES-CARRIERES
21220	CUSSEY-LES-FORGES
58094	DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
71171	DENNEVY
71193	ETRIGNY
71202	FONTAINES
21339	LANTENAY
89237	MAILLY-LA-VILLE
21373	MALAIN
71274	MANCEY
89252	MERRY-SEC
21412	MEURSAULT
89260	MOLESMES
21462	NORGES-LA-VILLE
21464	NUITS-SAINT-GEORGES
21477	PANGES
71343	PARIS-L'HOPITAL
21485	PLOMBIERES-LES-DIJON
21512	PULIGNY-MONTRACHET
71378	RULLY
89337	SAINT-BRIS-LE-VINEUX
89341	SAINT-CYR-LES-COLONS
71397	SAINTE-CECILE
71425	SAINT-GILLES
71431	SAINT-JEAN-DE-TREZY
71442	SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
21592	SAVIGNY-SOUS-MALAIN
71525	SOLOGNY
89405	TAINGY
89416	THURY
21666	VERNOT



2.7 Région(s) biogéographique(s)  
Continente (100%)



### 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
					Représentativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
<a href="#">4030</a> <i>Landes sèches européennes</i>		0 (0 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">6110</a> <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Session albi</i>	X	0 (0 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">6210</a> <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>		35,37 (1 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">6510</a> <i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>		70,74 (2 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">8210</a> <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>		0 (0 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">8230</a> <i>Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii</i>		0 (0 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">8310</a> <i>Grottes non exploitées par le tourisme</i>		35,33 (1 %)		M	A	C	B	B
<a href="#">9130</a> <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>		35,37 (1 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">9150</a> <i>Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion</i>		0 (0 %)		P	B	C	B	B
<a href="#">9180</a> <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	X	0 (0 %)		P	B	C	B	B

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A =  $100 \geq p > 15 \%$  ; B =  $15 \geq p > 2 \%$  ; C =  $2 \geq p > 0 \%$ .
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Évaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».



### 3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A B C D			
				Min	Max				Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
M	1303	<a href="#">Rhinolophus hipposideros</a>	w	537	537	i	P	M	B	B	C	B
M	1303	<a href="#">Rhinolophus hipposideros</a>	r	34	34	i	P	P	B	B	C	B
M	1304	<a href="#">Rhinolophus ferrumequinum</a>	w	1219	1219	i	P	M	B	B	C	B
M	1304	<a href="#">Rhinolophus ferrumequinum</a>	r	107	107	i	P	P	B	B	C	B
M	1305	<a href="#">Rhinolophus euryale</a>	w	1	1	i	P	M	C	B	A	B
M	1308	<a href="#">Barbastella barbastellus</a>	w	80	80	i	P	M	C	B	C	B
M	1308	<a href="#">Barbastella barbastellus</a>	r	16	16	i	P	P	C	B	C	B
M	1310	<a href="#">Miniopterus schreibersii</a>	w	9	9	i	P	M	C	B	B	B
M	1310	<a href="#">Miniopterus schreibersii</a>	c	1000	1000	i	P	P	C	B	B	B
M	1321	<a href="#">Myotis emarginatus</a>	w	799	799	i	P	M	B	B	C	B
M	1321	<a href="#">Myotis emarginatus</a>	r	34	34	i	P	P	B	B	C	B
M	1323	<a href="#">Myotis bechsteinii</a>	w	12	12	i	P	M	D			
M	1324	<a href="#">Myotis myotis</a>	w	1315	1315	i	P	M	B	B	C	B
M	1324	<a href="#">Myotis myotis</a>	r	247	247	i	P	P	B	B	C	B

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.



- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

### 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max			IV	V	A	B	C	D
A		<a href="#">Salamandra salamandra</a>			i	P			X		X	
A		<a href="#">Alytes obstetricans</a>			i	P	X		X		X	
A		<a href="#">Bufo bufo</a>			i	P			X		X	
A		<a href="#">Hyla arborea</a>			i	P	X		X		X	
B		<a href="#">Alcedo atthis</a>			i	P			X		X	
I		<a href="#">Cordulegaster bidentatus</a>			i	P						X
M		<a href="#">Eptesicus serotinus serotinus</a>	7	7	i	P						X
M		<a href="#">Myotis mystacinus</a>	1171	1171	i	P			X		X	
M		<a href="#">Myotis nattereri</a>	178	178	i	P			X		X	
M		<a href="#">Myotis daubentoni</a>	257	257	i	P						X
M		<a href="#">Nyctalus leisleri</a>			i	P			X		X	
M		<a href="#">Pipistrellus pipistrellus</a>			i	P			X		X	
M		<a href="#">Pipistrellus nathusii</a>			i	P			X		X	
M		<a href="#">Pipistrellus kuhli</a>			i	P						X
M		<a href="#">Felis sylvestris</a>			i	P						X
M		<a href="#">Mustela putorius</a>			i	P		X	X		X	
P		<a href="#">Acer monspessulanum</a>			i	P						X
P		<a href="#">Aster amellus</a>			i	P						X



P		<a href="#">Aster linosyris</a>			i	P							X
P		<a href="#">Bombycilaena erecta</a>			i	P							X
P		<a href="#">Cytisus lotoides</a>			i	P							X
P		<a href="#">Daphne alpina</a>			i	P							X
P		<a href="#">Hippocrepis emerus</a>			i	P							X
P		<a href="#">Inula montana</a>			i	P							X
P		<a href="#">Meconopsis cambrica</a>			i	P							X
P		<a href="#">Sorbus latifolia</a>			i	P							X
R		<a href="#">Lacerta viridis</a>			i	P	X						X
R		<a href="#">Coluber viridiflavus</a>			i	P	X						X

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : **IV, V** : annexe où est inscrite l'espèce (directive « Habitats ») ; **A** : liste rouge nationale ; **B** : espèce endémique ; **C** : conventions internationales ; **D** : autres raisons.



## 4. DESCRIPTION DU SITE

### 4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	1 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	25 %
N15 : Autres terres arables	15 %
N16 : Forêts caducifoliées	41 %
N17 : Forêts de résineux	6 %
N19 : Forêts mixtes	9 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	3 %

### Autres caractéristiques du site

Ce site recoupe partiellement les sites FR2600960 et FR2601000.

Il se caractérise principalement par les cavités, naturelles ou artificielles, occupées par les chiroptères en hibernation, la couverture végétale en projection du réseau souterrain et les abords immédiats de l'entrée des cavités.

Vulnérabilité : Les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une surfréquentation humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation de carrières

) peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites plus paisibles. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauves-souris (travaux condamnant l'accès par les chauves-souris comme la pose de grillage dans les clochers d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages d'art, coupe d'arbres creux, modification des accès ou de la couverture végétale des cavités)

Les modes de gestion forestiers favorisant les peuplements autochtones et diversifiés (gestion en futaie irrégulière, jardinée, taillis-sous-futaie) permettent de répondre favorablement aux exigences écologiques des différentes espèces de chauve-souris. A contrario, les traitements trop uniformes, notamment à base d'essences non autochtones, n'offrent pas les mêmes capacités d'accueil.

Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement des insectes, source d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien des ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris. Des pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne qualité des eaux. Une modification de ces pratiques risque d'en modifier la qualité. En revanche, les cultures intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi que le retournement des prairies constituent des facteurs d'isolement des populations pour de nombreuses espèces faunistiques (en particulier les amphibiens et les chauves-souris).

### 4.2 Qualité et importance

Ce site est constitué un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties sur les départements de la Côte d'Or de la Saône-et-Loire et de l'Yonne et de la Nièvre et présentant un très grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses espèces de Chiroptères. A noter la présence du Rhinolophe euryale en Côte d'Or et du Minioptère de Schreibers. Il est composé de 27 " entités " réparties sur 45 communes et ce, sur toute la Bourgogne. Chaque entité présentant une à plusieurs cavités.

En France, toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement protégées sur le territoire national et considérées comme prioritaires en Europe. Au sein des périmètres de ce site Natura 2000 FR2600975, il a été noté la présence de 15 espèces de chauves-souris dont 8 sont d'intérêt européen. Toutes sont présentes en hibernation et 5 espèces de chauves-souris sont concernées par des gîtes de mise bas. Concernant les espèces d'intérêt européen, le site proposé prend en compte les populations régionales en hibernation suivantes (compte tenu des connaissances régionales, analyse de 1995 à 2004) :

- 28% du Petit rhinolophe
- 67% du Grand rhinolophe
- 67% du Rhinolophe euryale
- 77% du Vespertilion à oreilles échancrées



- 31% du Vespertilion de Bechstein
- 71% du Grand murin
- 39% du Barbastelle d'Europe
- 100% du Minioptère de Schreibers

Le type d'habitat principal du site Natura 2000 FR2600975 est inscrit à l'annexe I de la Directive " Habitats, Faune-Flore " sous l'intitulé " Grottes non exploitées par le tourisme ". Cet habitat est de très grande importance pour la conservation d'espèces d'intérêt européen de la même directive (chauves-souris, amphibiens...).

### 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		I
H	A10.01	Elimination des haies et bosquets ou des broussailles		I
H	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		I
H	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		I
H	G01.04	Alpinisme, escalade, spéléologie		I
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I
H	G05.04	Vandalisme		I
M	A01	Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)		O
M	A07	Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A04	Pâturage		I
L	B	Sylviculture et opérations forestières		O

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

### 4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Domaine privé communal	%

### 4.5 Documentation

- GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE, PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN, 1997 - Observations naturalistes sur deux sites naturels remarquables de Bourgogne. Site 20 : Grottes à Chauves souris de Côte d'Or. Grotte du Contard - Plombières-les-Dijon, Grotte du Peuptu de la Combe Chaignay - Vernot

- MAGNIEZ G. 199? - La grotte d'Antheuil, document pédagogique. Laboratoire de Biologie Animale, Université de Dijon.



- ROUE S.G. , 2002 - Plan régional d'actions chauves-souris dans le cadre du Plan de Développement des Zones Rurales en Bourgogne - années 1999, 2000, 2001. Groupe mammalogique et herpétologique de Bourgogne, Parc naturel régional du Morvan, Science et Nature, DIREN Bourgogne.

- GROUPE MAMMALOGIQUE ET HERPETOLOGIQUE DE BOURGOGNE, 2001 - Grottes d'Agneux et carrières souterraines de Saint-Hilaire : deux sites à chauves-souris susceptibles d'être intégrés au réseau de sites Natura 2000. Société d'histoire naturelle d'Autun.

Stéphane G. ROUÉ, Daniel SIRUGUE, 2004 - Proposition pour un complément du réseau Natura 2000 concernant les populations de chauves-souris en Bourgogne & le Groupe Chiroptères Bourgogne. Société d'histoire naturelle d'Autun, Direction Régionale de l'Environnement en Bourgogne.

Collectif, 2006 - Les chauves souris : plan régional d'actions, actes des deuxièmes rencontres chiroptères Grand est. Bourgogne nature. Société des sciences naturelles de Bourgogne, Société d'histoire naturelle d'Autun, Parc naturel Régional du Morvan. HS1. 160p.

#### Lien(s) :

[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Haute-Ile\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle293bd8-1.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Haute-Ile_Docob_SSD_080311_bassedef_cle293bd8-1.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Beaumonts\\_Docob\\_SSD\\_0311\\_bassedef\\_cle093fe3.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Beaumonts_Docob_SSD_0311_bassedef_cle093fe3.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Georges\\_Valbon\\_Docob\\_SSD\\_0311\\_bassedef\\_cle54b515.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Georges_Valbon_Docob_SSD_0311_bassedef_cle54b515.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Fosse\\_Maussoin\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle7e475b.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Fosse_Maussoin_Docob_SSD_080311_bassedef_cle7e475b.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Bondy-Dhuis\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle22f5e1.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Bondy-Dhuis_Docob_SSD_080311_bassedef_cle22f5e1.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Sausset\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle0e35ab.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Sausset_Docob_SSD_080311_bassedef_cle0e35ab.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Poudrierie\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle2e9df8.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Poudrierie_Docob_SSD_080311_bassedef_cle2e9df8.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Plateau\\_Avron\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle04199f.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Plateau_Avron_Docob_SSD_080311_bassedef_cle04199f.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Bernouille-Chelles-Aulnoye\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle7416a5.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Bernouille-Chelles-Aulnoye_Docob_SSD_080311_bassedef_cle7416a5.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_Ile\\_St\\_Denis\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle5d7789.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_Ile_St_Denis_Docob_SSD_080311_bassedef_cle5d7789.pdf)  
[http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65\\_JMG\\_Docob\\_SSD\\_080311\\_bassedef\\_cle0113d2.pdf](http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODCOMMENTAIRE/65_JMG_Docob_SSD_080311_bassedef_cle0113d2.pdf)

### 5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
31	Site inscrit selon la loi de 1930	1 %
32	Site classé selon la loi de 1930	0 %
38	Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site d#intérêt géologique	1 %

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
31	Site de la Côte Chalonnaise	-	1%
31	Château de Berzé le Châtel et ses abords	+	0%



31	3 Grottes (Blanot, Mont Saint Romain, Bel affreux)	+	0%
32	Montagne des Trois Croix	-	0%
38	Tunnel du Bois Clair	+	1%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

### 5.3 Désignation du site

Ces sites sont en relation avec les sites de l'Est de la France (Franche-Comté) et de Suisse pour le Minoptère

## 6. GESTION DU SITE

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

### 6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Oui Nom :  
Lien :  
[http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD\\_REFDOC\\_0517092&DOCBASE=IFD\\_SIDE](http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=exploitation&OUTPUT=PORTAL&DOCID=IFD_REFDOC_0517092&DOCBASE=IFD_SIDE)

Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Non

### 6.3 Mesures de conservation

S'agissant essentiellement d'anciennes carrières, elles sont soit communales soit privées. Seules deux d'entre elles sont aménagées partiellement pour recevoir du public.

Ces grottes sont régulièrement suivies depuis 1995 par le groupe mammalogique et herpétologique de Bourgogne dans le cadre, notamment, du deuxième plan régional d'action pour les chauve-souris .

Il a pour principaux objectifs :

- Etat des connaissances sur les chiroptères en Bourgogne
- Inventaire des espèces et des habitats
- Propositions pour la conservation des habitats et des espèces et intégration aux démarches de gestion de l'espace rural.

En 2009, le document d'objectifs est en cours de rédaction par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun (S.H.N.A.).