


Typologie des haies selon la structure

HAIE MÉDIOCRE

**Hauteur**

extrêmement variable

Description

Une haie dite « médiocre » est une haie qui présente des signes de dépérissement, discontinue, pouvant rassembler les 3 strates, à un stade relictuel :

- la strate arborescente, souvent composée d'arbres « rachitiques », dépérissants ou morts ;
- la strate arbustive, fréquemment discontinue, strate composée d'arbustes malingres ou implantés, éventuellement, par ornithochorie (*);
- la strate herbacée, souvent importante et à base de ronces du fait de la lumière (faible concurrence avec la strate arbustive).

Caractéristiques

Dans la typologie des haies, cette rubrique regroupe des cas forts différents. **La hauteur est très variable**. La structure linéaire est perturbée, rompue ou ne s'est pas encore constituée, comme dans le cas des haies d'ornithochorie (*).

Cette haie peut s'interposer entre 2 prairies regroupées ; elle se dégrade suite au passage du bétail à travers sa ligne d'implantation, suite aussi au piétinement et/ou au frottement. Ce type de haie peut comprendre des arbres dépérissants (par taille excessive, absence d'entretien...), voire des arbres morts qui n'ont pas été retirés par l'exploitant agricole.

Cette formation arbustive est une **haie vive dégradée ou en cours de formation**. Sa diversité floristique, souvent décroissante dans une haie dégradée, s'accroît lorsque la haie s'implante naturellement, au fil du temps.

Étant souvent une source de nourriture (= baies, insectes...) bien moins abondante que le brise-vent (grand ou moyen), la haie médiocre peut néanmoins **répondre à certains besoins d'espèces faunistiques** (en particulier, caches pour les micromammifères, perchoirs pour les rapaces...).

(*) ornithochorie = dispersion des graines ou du pollen par les oiseaux. Une « haie d'ornithochorie » se développe le long de clôtures sur lesquelles des oiseaux sont venus se percher (déjections).

Dynamique

La tendance naturelle d'évolution de la haie médiocre est à l'élargissement de l'ourlet (prolifération des ronces notamment) et à l'augmentation du nombre d'individus ligneux (arbres ou arbustes) morts ou dépérissants.

A l'inverse, **les haies d'ornithochorie**, se développant au pied de clôtures de barbelés, tendent à se densifier et à combler les discontinuités, **formant à terme de belles haies buissonnantes** englobant les clôtures à l'origine de leur formation.

Fonctions

+ Biodiversité/écologie	+ Paysagère	# 0	Anti-érosive
+ Brise-vent	+ Patrimoniale	# 0	Hydraulique



Ensemble de haies médiocres dans une zone prairiale qui tapisse un fond de vallée humide. Ces haies se sont développées le long de clôtures, par ornithochorie.



Haie dégradée, fort peu épaisse, en bordure d'une Voie Communale ; sa base est discontinue, les arbustes la constituant étant dépérissants. Sa biodiversité, floristique en particulier, est faible.